

## Aktuelle Studien

Ovarialcarcinom – Primärtherapie			
Name	Beschreibung		Status
<b>AGO-Ovar 23- DUO-O</b>	Randomisierte, doppelblinde placebokontrollierte, multizentrische Phase III Studie bei Patientinnen mit neu diagnostiziertem fortgeschrittenem Ovarialcarcinom	Durvalumab in Kombination mit Chemotherapie und Bevacizumab, gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit Durvalumab, Bevacizumab und Olaparib.	Status: offen
Ovarialcarcinom – Rezidiv			
Name	Beschreibung		Status
<b>Compass-Studie</b>	Vergleich der Lebensqualität bei Patientinnen mit platin sensitivem rezidivierten Ovarial-, Eileiter- und Bauchfellkarzinom bei der Behandlung mit Trabectedin/PLD oder einer platinbasierten Standardtherapie	Trabectedin/PLD (=pegyliertes liposomales Doxorubicin-Hydrochlorid) im Vgl. der Behandlung mit Standardtherapie (Carboplatin/PDL, Carboplatin/Gemcitabin, Carboplatin/Paclitaxel). Erfassen von Lebensqualitätsbögen und klinischen Therapiedaten.	offen
<b>AGO-OVAR 2.29</b>	Rezidivierendes epitheliales Ovarial-, Tuben oder primäres Peritonealcarcinom. Erst- oder Zweitrezidiv, innerhalb von 6 Monaten nach Platinhaltiger Chemotherapie oder dem dritten Rezidiv.	Atezolizumab mit Bevacizumab und Chemotherapie vs. Bevacizumab und CHT.	offen

## Aktuelle Studien

<b>AGO-OVAR 2.32</b>	Rezidivierendes epitheliales Ovarial- oder Tubencarcinom sowie extraovarielle serös-papilläre Karzinome.	Trabectedin/PLD vs. Fortführung einer platinbasierten CHT.	offen
<b>Endometrium-Carcinom – fortgeschritten oder Rezidiv</b>			
Name		Beschreibung	Status
<b>SIENDO/ ENGOT-EN5</b>	Phase III-Studie bei Patientinnen mit fortgeschrittenem oder rezidivierendem Endometriumcarcinom	Erhaltungstherapie mit Selinexor/Placebo nach Kombinationschemotherapie	offen
<b>ENGOT-EN6/ GOG 3031- TESARO</b>	Phase- III- Studie, doppelblind bei primär fortgeschrittenem Endometriumcarcinom oder Rezidiv zur Austestung von Chemotherapie mit Carboplatin/ Paclitaxel in Kombination mit Dostarlimab vs. Placebo	Chemotherapie mit 6 Zyklen Carboplatin/ Paclitaxel in Kombination mit Dostarlimab vs. Placebo q3w mit Fortsetzung der Therapie mit Dostarlimab/ Placebo bis zu 3 Jahre	
<b>Gynäkologische Tumoren</b>			
Name	Beschreibung	Name	Beschreibung
<b>EMRISK-Studie</b>	Patientinnen mit der Erstdiagnose eines gynäkologischen Malignoms, die für eine Chemotherapie vorgesehen sind	<b>EMRISK-Studie</b>	Patientinnen mit der Erstdiagnose eines gynäkologischen Malignoms, die für eine Chemotherapie vorgesehen sind